

68. 男, 50 岁, 70 公斤。细胞外液量约为
- A. 20000 ml B. 18000 ml C. 16000 ml
D. 14000 ml E. 12000 ml
69. 关于外科感染, 叙述不正确的是
- A. 疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
B. 痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓感染
C. 急性蜂窝织炎是皮下筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
D. 甲沟炎是指指甲沟及其周围组织的急性感染
E. 脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织化脓性感染
70. 通常情况下, 术后胃肠减压拔管的指征是
- A. 术后 3 天 B. 肛门排气后 C. 肠鸣音存在
D. 无肠鸣音 E. 病人要求拔除
71. 关于休克的一般紧急治疗, 不正确的选项为
- A. 创伤制动、保证呼吸道通畅 B. 及早建立静脉通路
C. 采取平卧体位 D. 早期予以鼻导管或面罩吸氧
E. 注意保温
72. 有关术后早期活动, 不正确的选项为
- A. 改善血液循环 B. 减少腹胀及尿潴留 C. 减少肺部并发症
D. 延缓切口愈合 E. 减少下肢静脉血栓形成
73. 符合诊断急性呼吸窘迫综合症的指标是
- A. 胸片显示有广泛点、片状阴影
B. 双肺可闻及湿啰音
C. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{mmHg}$
D. 一般吸氧治疗无效
E. 呼吸频率逐渐加快
74. 有助于鉴别肾前性和肾后性急性肾衰竭的检查是
- A. 磁共振水成像 B. 肾穿刺活检 C. 血常规
D. 血尿素氮和肌酐 E. 每小时尿量
75. 烧伤早期抗休克应先补充
- A. 全血 B. 血浆 C. 电解质液
D. 5% 葡萄糖液 E. 10% 葡萄糖液
76. 破伤风的治疗原则是
- A. 预防和抢救休克
B. 早期行气管切开
C. 清除毒素来源、中和毒素、控制和解除痉挛
D. 高压氧治疗
E. 应用破伤风类毒素
77. 最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是
- A. 乳头状疣 B. 老年斑 C. 皮肤癌
D. 黑痣 E. 黑色素瘤
78. 复苏后处理的原则中不包括的选项是
- A. 维持良好的呼吸功能 B. 持续应用抗菌药物 C. 确保循环功能稳定
D. 防治肾衰竭 E. 防治脑水肿