

79. 输血的目的不包括
- A. 对出血病人补充血容量
 - B. 纠正贫血
 - C. 改善凝血功能
 - D. 杀灭细菌抗感染
 - E. 提高血浆蛋白
80. 污染伤口是指
- A. 已化脓的伤口
 - B. 有细菌存在,但尚未发生感染的伤口
 - C. 有细菌存在,并已发生感染的伤口
 - D. 局部红肿并有分泌物的伤口
 - E. 腹股沟疝手术切口
81. 下列监测值中不正确的是
- A. CVP 的正常值为 $5 \sim 10 \text{cmH}_2\text{O}$
 - B. PCWP 的正常值为 $6 \sim 15 \text{cmH}_2\text{O}$
 - C. 心排血量的正常值为 $4 \sim 6 \text{L/min}$
 - D. 动脉血乳酸盐正常值为 $1 \sim 1.5 \text{mmol/L}$
 - E. 血 pH 的正常范围为 $7.35 \sim 7.45$
82. 胸外心脏按压时,正确的按压部位是
- A. 胸骨左缘第 4 肋间
 - B. 胸骨左缘第 3 肋间
 - C. 左锁骨中线第 4 肋间
 - D. 胸骨下 1/2 处
 - E. 胸骨中上 1/3 交界处
83. 不属于预防性应用抗菌药物适应证的选项是
- A. 开放性骨折
 - B. 大面积烧伤
 - C. 甲状腺瘤手术后
 - D. 结肠手术前准备
 - E. 人造物置留手术
84. 具有横突肋凹的椎骨是
- A. 颈椎
 - B. 胸椎
 - C. 腰椎
 - D. 骶骨
 - E. 尾骨
- 二、B 型题:85 ~ 108 小题,每小题 1.25 分,共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项,请从中选出一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。**
85. 可做旋前、旋后运动的关节是
- A. 肩关节
 - B. 肘关节
 - C. 桡腕关节
 - D. 髋关节
 - E. 踝关节
86. 可做背屈和跖屈运动的关节是
- A. 尿道前列腺部
 - B. 尿道膜部
 - C. 尿道海绵体部
 - D. 输精管精索部
 - E. 输精管腹股沟部
87. 射精管的开口部位是
88. 输精管结扎的常选部位是
- A. 回肠动脉
 - B. 回结肠动脉
 - C. 右结肠动脉
 - D. 肠系膜下动脉
 - E. 髂内动脉
89. 上述动脉中,发出阑尾动脉的是
90. 上述动脉中,发出直肠上动脉的是
- A. 重力
 - B. 心率
 - C. 大动脉弹性
 - D. 每搏输出量
 - E. 外周阻力
91. 影响收缩压的最主要因素是
92. 显著影响老年人脉压的因素是