

16. 第2~4手指不能内收与外展,可能损伤的神经是
A. 肌皮神经 B. 尺神经 C. 正中神经
D. 桡神经 E. 腋神经
17. 舌前2/3味觉障碍伴泪腺分泌障碍,可能损伤的神经是
A. 三叉神经 B. 舌下神经 C. 动眼神经
D. 面神经 E. 上颌神经
18. 间脑的分部中包括外侧膝状体的是
A. 背侧丘脑 B. 后丘脑 C. 上丘脑
D. 下丘脑 E. 底丘脑
19. 大脑优势半球的额下回后部代表的中枢是
A. 运动性语言中枢 B. 感觉性语言中枢 C. 书写中枢
D. 视觉性语言中枢 E. 听区
20. 一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时,引起的视野缺损是
A. 患侧眼全盲 B. 双眼视野颞侧半偏盲 C. 双眼视野对侧半同向性偏盲
C. 患侧视野鼻侧半偏盲 D. 双眼视野对侧半同向性偏盲
E. 双眼视野鼻侧半偏盲
21. 不属于机体内环境的体液是
A. 组织液 B. 血浆 C. 淋巴液
D. 脑脊液 E. 细胞内液
22. 动作电位跳跃式传导的部位是
A. 无髓纤维 B. 肌节 C. 终板膜
D. 有髓纤维 E. 缝隙连接
23. 与组织液中含量基本相同的血浆成分是
A. 白蛋白 B. 电解质 C. 纤维蛋白原
D. 球蛋白 E. 透明质酸
24. 用已知ABO血型的血清可以鉴定的红细胞膜上的成分是
A. A抗原和B抗原 B. A抗原和H抗原 C. B抗原和H抗原
D. A抗原和B抗体 E. B抗原和A抗体
25. 增加冠脉血流量最主要的因素是
A. 交感神经兴奋 B. 迷走神经兴奋 C. 心肌代谢增强
D. 血管紧张素Ⅱ分泌增多 E. 血管升压素分泌增多
26. 造成心室前负荷增大的因素是
A. 心室充盈量增大 B. 心率增快 C. 静脉回流速度下降
D. 心肌收缩力增强 E. 心室顺应性减小
27. 提高心肌传导性的因素是
A. 静息电位减小 B. 动作电位去极化速度增大 C. 组织换气
C. 钠通道数量减少 D. 钠电流被阻断
E. 阈电位水平抬高
28. 呼吸的全过程不包括
A. 肺通气和换气 B. 细胞内氧化代谢 C. 组织换气
D. 肺牵张反射 E. 血液运输气体
29. 呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是
A. 吸气初 B. 吸气中期 C. 吸气末
D. 呼气中期 E. 呼气末